

葉たばこ用殺菌剤

ナイスカップル®

®は住化グリーン(株)の登録商標

特長

1

空洞病と立枯病に
優れた効果

オキシリニック酸と
ストレプトマイシン、
2つの有効成分の働きにより
難防除病害といわれる
空洞病と立枯病に優れた
効果を示します。

空洞病・
立枯病に!!

特長

2

予防効果と
治療効果

空洞病には予防と治療、
立枯病には予防の効果が
あります。



立枯病



空洞病



住化グリーン株式会社

ナイスカッパル®

農林水産省登録 第23317号

成分：オキシリニック酸10.0%
 ストレプトマイシン硫酸塩12.5%
 (ストレプトマイシンとして10.0%)

性状：類白色水和性粉末45μm以下

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

有効期限：4年

包装：100g×60袋

使用のポイント

1

病原菌は雨水によって葉たばこの傷口から侵入します。

葉たばこで大きい傷は主に次の3つです。

- ①風雨によるもの
- ②心止と収穫作業によるもの
- ③わき芽抑制剤によるもの

これらの傷をなるべく早く消毒・保護して発病を抑えましょう。

2

各産地の最適な使用時期は次のとおりですが、初発を認めたらすぐに防除してください。

●パーレー種

青森・岩手・秋田・福島：6月下旬、7月下旬(心止時)

●黄色種

茨城・千葉・新潟：6月中旬(心止時)、7月中旬

熊本・長崎・佐賀・大分・四国各県：5月下旬(心止時)、6月下旬



宮崎・鹿児島：5月中旬(心止時)、6月下旬

沖縄：4月下旬(心止時)、5月下旬

3

立枯病の防除は、ごく初発時に散布しましょう。

試験成績



適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	オキシリニック酸を含む農薬の総使用回数	ストレプトマイシンを含む農薬の総使用回数	使用方法
たばこ	空胴病 立枯病	1000倍	100~180 ℓ/10a	収穫 10日前まで	2回以内	2回以内	2回以内	茎葉散布

△使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使い切ってください。
- 高温時には薬害(クロロシス)を生ずるおそれがあるので注意してください。
- 本剤の連続使用によって薬剤耐性菌が出現し、効果の劣った事例があるので、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

△安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣類を交換してください。
- 作業時に着用していた衣類などは他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使い切ってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管：密閉し、食品と区別して、直射日光の当たらない冷涼・乾燥した所で保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●使用後の容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

SCC GROUP
 住友化学 アグログループ



住化グリーン株式会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号
 TEL.(03)6837-9422 FAX.(03)6837-9423
<http://www.sumika-green.jp>