

新発売

決まり手は
「打ち込み」



驚異の
即効性

アメリカシロヒトリ
サクラの
などに

樹幹注入剤

打ち込み上手[®]

サクラ (被害)



アメリカシロヒトリ (幼虫)



モンクロシャチホコ (幼虫)



プラタナスグンバイ (成虫)



住化グリーン株式会社

樹幹注入剤

打ち込み上手®

農林水産省登録 第23389号

成分：アセフェート……95%

性状：類白色水和性粉末

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）

包装：50g×10袋


特長

- 樹上に発生する害虫を、薬剤散布することなく防除できます。
- 薬剤飛散の心配もなく、住宅地や街路樹でも安心して使用できます。
- 注入量が少なく、注入容器の回収も必要ないため、作業効率が良いです。
- 優れた浸透移行性を有します。


■適用害虫および使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
さくら	モンクロシャチホコ アメリカシロヒトリ	2倍	1孔当り1ml	発生初期	2回以内	樹幹部に10cm間隔で注入孔をあけ、注入器の先端を押し込み樹幹注入する	5回以内
プラタナス	プラタナスグンバイ						

■上手な使い方



(試験成績) アメリカシロヒトリに対する効果(処理6日後)



試験方法：枝先を網で覆い、その中にアメリカシロヒトリの幼虫5頭を放飼し、薬剤を所定量処理。経時的に幼虫の生死および葉の食害程度を調査。
薬剤処理・接種：2015年6月26日
調査：2015年7月2日

⚠ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせて調製し、使い切ってください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。
- 使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用后(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないように注意を払ってください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

SCC GROUP
住友化学 アグログループ



住化グリーン株式会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号
TEL. (03) 6837-9422 FAX. (03) 6837-9423
<http://www.sumika-green.jp>