

芝用殺菌剤

ディアマンテ

トルクロホスメチル・マンデストロビン水和剤

平成 29 年 8 月 30 日付けで以下の適用拡大が登録されました。

(変更事項)

- ・ ダラースポット病に対する使用量を変更する。
- ・ 既登録部分の「希釈倍数」及び「使用液量」の表記を「使用量」、「薬量」及び「希釈水量」に変更する。

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルクロホスメチルを含む農薬の総使用回数	マンデストロビンを含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ヘントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ) ダラースポット病 炭疽病	1000 倍	0.5 L/m ²	発病 初期	5 回以内	散布	5 回以内	8 回以内
	フェアリーリング病	2000 倍	1.0 L/m ²					

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルクロホスメチルを含む農薬の総使用回数	マンデストロビンを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量					
西洋芝 (ヘントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ) 炭疽病	0.5 mL/m ²	0.5L/m ²	発病 初期	5 回以内	散布	5 回以内	8 回以内
	ダラースポット病		0.05～ 0.5L/m ²					
	フェアリーリング病		1.0 L/m ²					

使用上の注意事項などについては、製品に添付されているラベルを参照のこと。

住化グリーン株式会社